

# CARTILHA ZOOOLÓGICO



# AVES



# ARARA AZUL GRANDE



Nome científico: *Anodorhynchus hyacinthinus*

Distribuição: Principalmente no Brasil, mas também estende-se pelas florestas da América do sul.

Habitat: Habita buritizais (matas, cerrados), florestas de galeria.

Comportamento: Vive em bandos ou casais.

Longevidade: 40 anos.

Incubação: 27 a 30 dias.

Nº de filhotes: 2 a 3 ovos.

Peso adulto: 1,5 kg

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos e principalmente sementes.

Ameaçado  
de Extinção

# ARARA AZUL GRANDE



- Plumagem totalmente azul, com um anel amarelo em torno do olho e fita da mesma cor na base da mandíbula.
  - Azul escuro que ao longe parece preta (conhecida também como arara-preta).
  - Faz ninhos em troncos de árvores ou barrancos chegando a botar de 2 a 3 ovos.
  - Um animal endêmico (espécie de área restrita) da América do Sul.
- Ameaçado de extinção devido sua caça e destruição de habitat.
- Também conhecida como arara-uno ou arara-hiainta.

Ameaçado  
de Extinção

# ARARA HÍBRIDA



Nome científico: *Ara ararauna* x *Ara chloropterus*

Distribuição: É um animal encontrado em cativeiro, porém há relatos na natureza.

Habitat: Habita buritizais (matas, cerrados), florestas de galeria.

Comportamento: Vive em bandos ou casais.

Longevidade: 60 anos.

Incubação: 25 dias.

Nº de filhotes: 2 a 4 ovos.

Peso adulto: 1,5 kg

Alimentação na natureza: Frugívoro: Frutos e principalmente sementes.

# ARARA HÍBRIDA



- O hibridismo é o cruzamento de dois animais de espécies ou gêneros diferentes, resultando em descendente que podem ser de três tipos:
- **Férteis:** Quando macho e fêmea são totalmente férteis, podendo assim gerar filhotes férteis.
- **Inférteis:** Quando macho e fêmea são inférteis, não podendo gerar filhotes (*Nesses casos, o híbrido infértil nem é considerada uma nova espécie, pois ele não pode gerar indivíduo para formar uma população*)
- **Semi Férteis:** Quando somente os machos ou as fêmeas têm capacidade de se reproduzir.

# ARARA-CANINDÉ



Nome científico: *Ara ararauna*

Distribuição: América Central ao Brasil.

Habitat: Várzeas com buritizais e beira de matas.

Comportamento: Vive em bandos.

Longevidade: 60 anos.

Incubação: 25 dias.

Nº de ovos: 02 a 03.

Peso adulto: 1 a 1,5 kg

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos, vegetais, grãos e sementes.

# ARARA-CANINDÉ



- Em especial a Arara Canindé quando escolhe um parceiro é para a vida toda.
- Pode ser formado casal de macho com macho ou até mesmo fêmea com fêmea.
- Possuem uma vocalização bem característica e que pode ser escutada de muito longe.
- É uma ave com comportamento passivo, é possível ser domesticada com muita facilidade, apesar de serem proibidas a utilização desses animais como animais de estimação.
- Migram em certas épocas do ano em busca de alimento.
- Deslocam-se a grandes distâncias durante o dia entre os locais de descanso e de alimentação.

# ARARA-VERMELHA



Nome científico: *Ara chloroptera*

Distribuição: América Central ao Paraguai, e norte da Argentina.

Habitat: Florestas e cerrados.

Comportamento: Vivem em pares.

Longevidade: 50 anos.

Incubação: 30 dias.

Nº de ovos: 02 a 03.

Peso adulto: 1 a 1,5 kg

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos, vegetais, grãos e sementes.

# ARARA-VERMELHA



- A arara grita alto, muito alto, e sua voz não é nada afinada.
- Elas possuem um bico muito forte, língua carnosa e cauda longa em forma de espada.
- Alimentam-se principalmente de sementes, castanhas, frutos e insetos.
- O bico forte permite que elas escavem o tronco das árvores para comer larvas de insetos.
- Os filhotes com 6 meses de idade já são considerados adultos.
- Foi localmente extinta de lugares que ocorria antigamente, como no Espírito Santo, boa parte da Bahia e o norte do Rio de Janeiro.

# PAPAGAIO-DO-MANGUE



Nome científico: *Amazona amazonica*

Distribuição: Colômbia, Venezuela, Guianas ao Peru, Trinidad Tobago e Brasil.

Habitat: Mata, litoral atlântico e manguezais.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 40 anos.

Incubação: 25 a 26 dias.

Nº de ovos: 03.

Peso adulto: 350 a 400 g

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos, folhas e sementes.

# PAPAGAIO-DO-MANGUE



- É uma espécie ameaçada de extinção devido ao tráfico.
- É uma espécie endêmica (encontrado exclusivamente em determinada região) das Américas.
- Chegam a viver 50 anos de idade se forem tratados adequadamente.
- No período reprodutivo, pousa em galhos altos e começa a improvisar uma série de gritos e assobios.
- É uma espécie monogâmica (o casal permanece unido por toda vida).
- Vive em bandos de até 8 indivíduos, reunindo-se às centenas para pernoitar, quando fazem bastante barulho.

# PAPAGAIO-VERDADEIRO



Nome científico: *Amazona aestiva*

Distribuição: Paraguai, norte da Argentina, Bolívia e Brasil.

Habitat: Matas úmidas, secas e beiras de rios.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: Mais que 50 anos.

Incubação: 29 dias.

Nº de ovos: 03 a 04.

Pesos adulto: 350 a 400 g

Alimentação na natureza: Frugívoro: sementes, frutos, folhas e grãos.

# PAPAGAIO-VERDADEIRO



- O Papagaio-verdadeiro é o mais comum a ser domesticado.
- São Psitacídeos caracterizado por seu bico curvado se alimentando de sementes, frutos e folhas.
- Macho e fêmea voam tão juntos um do outro que o casal parece ser uma grande e fabulosa ave de quatro asas, o que se observa inclusive quando estão em bando.
- A melhor defesa que possui é ficar imóvel e calado.

# TIRIBA-GRANDE



Nome científico: *Pyrrhura cruentata*

Distribuição: Sul da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Habitat: Mata Atlântica. Em florestas úmidas das baixadas litorâneas

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 24 a 26 dias.


Nº de ovos: 02 a 04.

Pesos adulto: 130 g

Alimentação na natureza: Frugívoro: sementes, frutos, folhas e grãos.

Ameaçado  
de Extinção

# TIRIBA-GRANDE



- É uma espécie endêmica e está ameaçada de extinção devido ao desmatamento de seu hábitat.
- É encontrado da Mata Atlântica às florestas úmidas das baixadas litorâneas e em matas de tabuleiro.
- Foram encontrados indivíduos a 920 metros do nível do mar no interior de Minas Gerais.
- Medindo 30 cm de comprimento, é a maior espécie do gênero *Pyrrhura*.
- Se distingue das outras pelo tom mais claro das auriculares e pelo píleo (parte superior da cabeça) marrom escuro.

Ameaçado  
de Extinção

# PERIQUITO-DE-ENCONTRO-AMARELO



Nome científico: *Brotogeris chiriri*

Distribuição: América do Sul (Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina e Brasil).

Habitat: Campos de vegetação baixa, ilhas de matas intercaladas, matas ciliares, cerrados e cerradões.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 24 dias.

Nº de ovos: 5 ovos.

Peso adulto: 72 g

Alimentação na natureza: frutos, sementes, flores e néctar.

# PERIQUITO-DE-ENCONTRO-AMARELO



- Periquito predominantemente verde, com parte superior da asa amarela. Possui Cauda longa e pontuda.
- Vivem entre 10 e 15 anos. Deslocam-se em bandos, muitas vezes de muitos indivíduos.
- Possui bico resistente e de cor branco-amarronzada, pelo qual parte seu alimento.
- Adaptou-se aos ambientes urbanos, onde se tornou muito comum.
- Faz o ninho em cavidades de árvores, telhas de edificações e até mesmo em ninhos escavados em cupinzeiros arborícolas e em casas de João de barro abandonadas.

# PERIQUITO-DA-CAATINGA



Nome científico: *Aratinga cactorum*

Distribuição: Caatinga. Norte e nordeste de Minas Gerais.

Habitat: Matas secas, cerrados, buritizais e áreas abertas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 21 dias.

Nº de ovos: 06.

Peso adulto: 120 g

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos, sementes, flores e néctar.

# PERIQUITO-DA-CAATINGA



Nome científico: *Aratinga cactorum*

Distribuição: Caatinga. Norte e nordeste de Minas Gerais.

Habitat: Matas secas, cerrados, buritizais e áreas abertas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 21 dias.

Nº de ovos: 06.

Peso adulto: 120 g

Alimentação na natureza: Frugívoro: frutos, sementes, flores e néctar.

# PERIQUITO-REI



Nome científico: *Aratinga aurea*

Distribuição: Pará, Paraná, Amapá, Bolívia, Peru e Argentina.

Habitat: Áreas secas e abertas, cerrado e caatinga.

Comportamento: Vivem em casais.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 23 dias.

Nº de ovos: 3 a 4.

Peso adulto: 84 g

Alimentação na natureza: Frutos, flores, insetos, cupins e sementes.

# PERIQUITO-REI



- O periquito-rei é uma ave psittaciforme, das mais conhecidas e abundantes representantes da família Psittacidae em nosso País.
- Mede cerca de 27 centímetros e pesa 84 gramas.
- Cabeça verde com uma faixa dianteira cor de pêssago, face azulada, ventre verde-amarelado. Com a região ao redor dos olhos laranja nos adultos e cinzento nos juvenis.
- Os filhotes são alimentados com frutos e sementes quebrados, regurgitados pelos pais.
- Presente principalmente da margem sul do rio Amazonas.

# PERIQUITO-RICO



Nome científico: *Brotogeris tirica*

Distribuição: Típica da Mata Atlântica.

Habitat: Mata de araucária e mata ciliar.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 26 dias.

Nº de ovos: 4 ovos.

Peso adulto: 69 a 80 g

Alimentação na natureza: Frutos, sementes e coquinhos.

# PERIQUITO-RICO



- A coloração básica da plumagem é verde. As partes inferiores e laterais da cabeça, peito e abdômen são de um verde com tons amarelados.
- O bico é amarronzado, mais claro no topo. Os pés são de cor semelhante à do bico, porém mais escura.
- A cauda é longa, com penas de coloração verde-azuladas.
- Alimentam-se de frutas, coquinhos de todos os tipos e também do fruto da paineira.
- Vivem em casais, ao que se sabe permanecem unidos por toda a vida.

# MARACANÃ-NOBRE



Nome científico: *Ara nobilis*

Distribuição: Nordeste e Sudeste do Brasil, Venezuela, Bolívia e Peru.

Habitat: Áreas semiabertas, cerrados, mata seca e floresta de eucaliptos.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 25 a 40 anos.

Incubação: 24 dias.

Nº de ovos: 02 a 04.

Peso adulto: 160 g

Alimentação na natureza: Frutos, sementes e coquinhos.

# MARACANÃ-NOBRE



- Habita uma variedade de ecossistemas incluindo cerrado, buritizais, beira de matas, caatinga, e plantações até 1400 metros.
- Vive normalmente em pares e em grandes bandos fora da época reprodutiva.
- Pode ser vista com frequência mesmo em grandes cidades como a cidade de São Paulo, porém, neste caso, como espécie introduzida.
- A maracanã é realmente uma ararinha. Distinguível pela testa azulada, pele branca nos lados do bico e ao redor dos olhos, e extremo da asa azul. Em voo vê-se a base da asa vermelha.

# JANDAIA-DE-TESTA-VERMELHA



Nome científico: *Aratinga auricapillus*

Distribuição: Da Bahia ao norte do Paraná, Minas Gerais e sul de Goiás.

Habitat: Matas.

Comportamento: Vivem em bando.

Longevidade: 30 anos.

Incubação: 24 dias.

Nº de ovos: 3 a 4 ovos.

Peso adulto: 130 g

Alimentação na natureza: Sementes, castanhas e frutas.

# JANDAIA-DE-TESTA-VERMELHA



- É conhecida também como periquito-rei e beira-rio.
- Verde escura, somente com a parte anterior da cabeça e abdômen lavados de vermelho.
- Não há diferenças externas aparentes entre machos e fêmeas.
- Alimenta-se de sementes, castanhas e frutas.
- Vivem em bandos grandes que dormem coletivamente em variados lugares.
- Sofre com a captura destinada ao comércio ilegal de animais silvestres.
- Não coletam materiais para a construção do ninho, colocando e chocando os ovos diretamente sobre o solo do local de nidificação.

# ARARAJUBA



Nome científico: *Graruba guarouba*

Distribuição: Encontrada exclusivamente no Brasil, do oeste do Maranhão à sudeste do Amazonas. Ao sul do Rio Amazonas e leste do Rio Madeira.

Habitat: Copa de florestas altas e úmidas.

Comportamento: Vivem em bando.

Longevidade: Cerca de 35 anos.

Incubação: 30 dias.

Nº de ovos: 2 a 3 ovos.

Peso adulto: 200 a 250 g

Alimentação na natureza: Semente, frutos oleosos, frutas e flores.

Ameaçado  
de Extinção

# ARARAJUBA



- É um psitacídeo de médio porte (34-36 cm de comprimento total).
- A Ararajuba chama a atenção pela beleza da plumagem de coloração amarelo-dourada, com as penas de vôo verdes.
- São aves residentes e vivem em grupos que podem variar de 3 a 30 indivíduos.
- Em perigo de extinção, as principais ameaças são a perda de habitat para as madeiras e fazendeiros e a retirada de filhotes dos ninhos para o comércio ilegal de animais silvestres.
- Espécie endêmica: Espécie de região restrita, encontrada apenas em um determinado Bioma ou Habitat.

Ameaçado  
de Extinção

# AVESTRUZ



Nome científico: *Struthio camelus*

Distribuição: África.

Habitat: Savanas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 50 a 70 anos.

Incubação: 42 dias.

Nº de ovos: 40 a 100 por ano.

Peso adulto: 115 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: pequenos animais, insetos, sementes, grãos, folhas e frutos.

# AVESTRUZ



- É a maior ave do mundo, chegando a pesar 120kg.
- Apesar de todo esse peso o avestruz pode alcançar 60km/h.
- Sua altura é de até 2.50m.
- Muitas pessoas acham que o avestruz é brasileiro mas sua origem é africana.
- Vive nas planícies e savanas do continente africano, chegando a viver 70 anos.
- O macho é quem choca os ovos da ninhada e quem faz o ninho.
- No Brasil existem fazendas especializadas em reprodução de avestruzes, pelo fato de sua carne ser muito saborosa e seu ovo muito nutritivo.

# URUMUTUM



Nome científico: *Nothocrax urumutum*

Distribuição: Região Amazônica (Brasil, Peru, Venezuela e Colômbia).

Habitat: Florestas úmidas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 15 a 20 anos.

Incubação: 30 dias.

Nº de ovos: 01 a 02.

Peso adulto: 1 a 1,5 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: folhas, frutos, insetos, moluscos, anfíbios e brotos.

# URUMUTUM



- Animal de vida noturna, originário da região amazônica.
- Chega a medir até 58cm de comprimento.
- Possuem plumagem pardacenta e a região próxima aos olhos nua e amarelo brilhante.
- Faz um grande ninho de gravetos, a cerca de 4 m de altura. Põe 2 ovos brancos e é atividade exclusiva da fêmea.
- Comporta-se em geral como outros mutuns, porém, costuma cantar mais durante a noite.

# MUTUM-DO-SUDESTE



Nome científico: *Crax blumenbachii*

Distribuição: Sul da Bahia, florestas atlânticas e na região sudeste do Brasil.

Habitat: Mata primária alta e regiões quentes e úmidas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 32 dias.

Nº de ovos: 01 a 02.

Peso adulto: 2,5 a 2,8 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: folhas, frutos, brotos, insetos, moluscos e anfíbios.

Ameaçado  
de Extinção

# MUTUM-DO-SUDESTE



- É uma ave que está ameaçada de extinção pela destruição de seu habitat.
- É um animal muito arisco, está atento a qualquer barulho.
- Demarcam um território de aproximadamente 3 Km para o acasalamento, que quando invadido por outra ave da mesma espécie, pode haver brigas violentas.
- A diferença entre o macho e a fêmea é a cor laranja do bico do macho.
- Atuam como grandes dispersores de sementes.
- Espécie endêmica do bioma Mata Atlântica, habita matas primárias em regiões quentes e úmidas.

Ameaçado  
de Extinção

# MUTUM-DE-PENACHO



Nome científico: *Crax fasciolata*

Distribuição: Paraguai, Argentina, Bolívia e Brasil (Sul dos Amazonas, Maranhão, São Paulo, Paraná e Minas Gerais).

Habitat: Mata ciliar, orla da mata e áreas litorâneas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 40 anos.

Incubação: 30 dias.

Nº de ovos: 02 a 04.

Peso Adulto: 2,7 a 2,8 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: folhas, frutos, brotos, insetos, moluscos e anfíbios.

Ameaçado  
de Extinção


# MUTUM-DE-PENACHO



- É uma ave que está ameaçada de extinção, apesar de sua reprodução em cativeiro ser muito rápida, chegando a botar 2 a 4 ovos.
- Um animal endêmico da América do Sul, sua caça e destruição de habitat fez com que esse animal chegasse a ponto da extinção.
- A característica marcante no macho é seu bico amarelo, e na fêmea o padrão de listras nas penas por todo o corpo que tem a função de não chamar atenção de predadores.
- Embora passe a maior parte do tempo no chão, empoleira-se para dormir.

Ameaçado  
de Extinção

# JACUMIRIM



Nome científico: *Penelope marail*

Distribuição: Comum no Nordeste da Amazônia.

Habitat: Encontrado em bordas de florestas úmidas, próximas de rios e lagoas.

Comportamento: Vive solitário ou em pequenos grupos.

Longevidade: 30 anos.


Incubação: 35 dias.

Número de ovos: 02 a 03.

Peso adulto: 0,95 a 1,15 kg

Alimentação na natureza: Frutos carnosos.

# JACUMIRIM



- Pardo cinza escuro, com brilho esverdeado.
- Alimenta-se basicamente de frutos carnosos, principalmente as dupas e bagas.
- É grande dispersor de sementes.
- Vive solitária ou em pequenos grupos familiares.
- É essencialmente arborícola (raramente descendo ao solo).
- É uma das menores espécies do gênero.
- Raramente encontrado em capoeiras.

# MUTUM-CAVALO



Nome científico: *Mitu tuberosa*

Distribuição: Brasil (Amazônia), Peru e Bolívia.

Habitat: Matas ripárias, matas de galerias, matas de terra firme e de várzea.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 40 anos.

Incubação: 30 dias.

Número de ovos: 2 a 3.

Peso adulto: 3,85 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: frutos, sementes e pequenos invertebrados.

# MUTUM-CAVALO



- É uma ave de plumagem negra.
- São predominantemente onívoros, alimentando-se de sementes e restos vegetais.
- Apenas 5% de sua dieta é obtida no alto das árvores.
- Habita as florestas antigas às margens dos rios.
- Pode ser encontrado no extremo sudeste da Colômbia, no leste do Peru e da Bolívia.
- No Brasil, ocorre a partir da calha sul do rio Amazonas até o Mato Grosso.
- Apesar de muito caçado em certos locais, ainda é comum na Amazônia meridional, onde se ouve seu canto bucólico.

# URUBU-REI



Nome Científico: *Sarcoramphus papa*

Distribuição: México, Bolívia, norte da Argentina, Uruguai e Brasil (regiões norte, meio norte e centro)

Habitat: Regiões permeadas, matas e campos.

Comportamento: Hábitos solitários.

Longevidade: 10 a 20 anos.

Incubação: 50 a 56 dias.


Nº de ovos: 02 a 03.

Peso Adulto: 3 a 3,5 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: pequenos animais, insetos e animais em decomposição.

Ameaçado  
de Extinção

# URUBU-REI



- Possui hábitos alimentares muito diferentes dos humanos, se alimentando de resto de animais.
- É muito importante preservarmos esses animais, pois atuam como “lixeiros naturais”.
- O Urubu rei possui esse nome pelo fato de seu bico e sua musculatura serem os mais fortes dentre todos as outras espécies de urubus.
- São eles que comem primeiro, pois conseguem rasgar a carne com facilidade.
- Para manterem a temperatura corporal estável, defecam sobre suas pernas, já que são animais que voam em grandes altitudes.

Ameaçado  
de Extinção

# ARARA PIRANGA



Nome científico: *Ara macao*

Distribuição: América do sul e América central.

Habitat: Várzeas com buritizais, babaçuais e beira de matas.

Comportamento: Vive em grupos ou em casais.

Longevidade: 40 a 60 anos.

Incubação: 25 dias.

Nº de ovos: 1 a 3 ovos.

Peso adulto: 0,9 a 1,4 kg

Alimentação na natureza: Sementes, flores, frutos.

# ARARA PIRANGA



- A espécie chega a medir até 89 cm de comprimento.
- Com plumagem geral vermelha com verde, asas em azul e amarelo, e face nua branca.
- Hábitos diurnos.
- Vivem em grupos e podem se misturar a bandos de outras araras.
- Sua alimentação varia entre sementes, flores e frutos, porém, ingere terra para obter minerais.
- Embora sofra com a caça ilegal para o comércio de animais silvestres é uma espécie com ampla distribuição.
- Também conhecida como araracanga.

# FALCÃO-DE-COLEIRA



Nome científico: *Falco femoralis*

Distribuição: Ocorre dos Estados Unidos ao sul do Chile e, em todo o Brasil.

Habitat: Campos, matas e áreas urbanas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 13 anos.

Incubação: 32 dias.

Número de ovos: 03.

Peso adulto: 407 a 680 g

Alimentação na natureza: Insetos, aves e roedores.

# FALCÃO-DE-COLEIRA



- Também conhecido como cauré, gavião-de-coleira e gavião-pombo.
- Espécie esbelta, de asas e cauda bastante longas. Possui largas faixas supraoculares brancas ligando-se na nuca.
- Come ocasionalmente pássaros e até cobras peçonhentas como a jararaca.
- Aparece nas grandes queimadas, onde pousa em árvores à frente do fogo para localizar presas.
- Não constroem ninhos, ocupando os já feitos por outras aves.
- Os ovos costumam ser densamente manchados, mas podem ser marrons quase uniformes.

# GAVIÃO-CARIJÓ



Nome científico: *Rupornis magnirostris*

Distribuição: México à Argentina e em todo o Brasil.

Habitat: Campos abertos.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 10 anos.

Incubação: 30 a 35 dias.

Nº de ovos: 01 a 02.

Peso adulto: 400 g

Alimentação na natureza: Carnívoro: insetos, pequenos répteis, pequenos animais.

# GAVIÃO-CARIJÓ



- Como toda ave de rapina, possui um papel indispensável no equilíbrio da fauna como regulador da seleção.
- Os machos são 20% menores que as fêmeas.
- Costumam voar em casais, fazendo movimentos circulares enquanto os dois vocalizam em dueto. Possui o hábito de utilizar o mesmo poleiro de caça por longo tempo (dias e até semanas).
- Sua ampla distribuição geográfica também se reflete nos seus hábitos alimentares generalistas, pois consomem desde insetos até aves e lagartos.
- Procuram os abrigos diurnos de morcegos para atacá-los enquanto dormem, e atacam ninhos de outras aves.

# GAVIÃO-CARCARÁ



Nome científico: *Polyborus plancus*

Distribuição: Sul dos Estados Unidos, América Central e do Sul.

Habitat: Campos abertos, cerrado e caatinga.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 08 a 10 anos.

Incubação: 28 dias.

Nº de ovos: 02 a 03.

Peso adulto: 01 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: lagartos, anfíbios, caracóis e animais em decomposição.

# GAVIÃO-CARCARÁ



- Considerado ave de rapina, são exímios caçadores, ágeis e velozes.
- Possuem imensa destreza em relação à captura de alimentos.
- Possuem garras, que quando fechadas travam e não se abrem até a morte da presa.
- Seu bico perfura e rasga com facilidade a presa.
- Também são considerados limpa-estrada, alimentando-se dos restos de animais atropelados nas rodovias.
- Chegam a medir até 50 cm.

# TUCANO-TOCO



Nome científico: *Ramphastos toco*

Distribuição: Paraguai, Bolívia, Argentina, e Brasil.

Habitat: Florestas e cerrado.

Comportamento: Vivem em casais.

Longevidade: 15 anos.

Incubação: 16 a 18 dias.

Nº de ovos: 02 a 04.

Peso adulto: 650 g

Alimentação na natureza: Onívoro: frutos, ovos, pequenos insetos e sementes.

# TUCANO-TOCO



- Espécies muito dóceis.
- Seu bico é diferenciado das outras aves para se alimentar das frutas onde somente os tucanos consigam alcançar.
- A estrutura de seu bico é formado por um osso chamado osso pneumático, são ossos leves e porosos, assim como todo seu esqueleto que é característico das aves.
- Habitam as matas de galeria, cerrado, capões. Única espécie da família Ramphastidae que não vive exclusivamente na floresta.
- Sua dieta consiste basicamente de frutas, insetos e artrópodes, mas também costuma saquear ninhos de outras aves e devorar ovos e filhotes.

# TUCANO-DE-BICO-VERDE



Nome científico: *Ramphastos dicolorus*

Distribuição: Brasil, Paraguai e Argentina.

Habitat: Áreas florestadas, áreas de Mata Atlântica.

Comportamento: Vive em casais.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 18 a 28 dias.

Número de ovos: 02 a 04.

Peso adulto: 320 g a 400 g

Alimentação na natureza: Onívoro: frutas, sementes e pequenos invertebrados

# TUCANO-DE-BICO-VERDE



- Tem cerca de 48 centímetros, boa parte correspondem ao bico.
- Apresenta papo amarelo e bico verde.
- O serrilhado do bico é bem desenvolvido e realçado pela cor vermelha sanguínea.
- Bota de 2 a 4 ovos, incubados durante 18 dias.
- É um animal onívoro.
- Gostam de banhar-se na folhagem molhada pela chuva.
- Costumam beber água acumulada nas bromélias.
- Era comum ao longo de toda sua área de ocorrência, entretanto, se tornou raro em muitas regiões devido à destruição de seu habitat natural.

# GRALHA-DO-CAMPO



Nome científico: *Cyanocorax cristatellus*

Distribuição: Região Centro- Oeste, Piauí, Maranhão, sul do Pará, Minas Gerais e São Paulo.

Habitat: Mata Atlântica, florestas úmidas das baixadas litorâneas.

Comportamento: Vive em bandos.

Longevidade: 14 anos.

Incubação: 16 a 18 dias.

Número de ovos: 3 a 4.

Peso adulto: 380 g

Alimentação na natureza: Onívora.

# GRALHA-DO-CAMPO



- Passam a maior parte do tempo em árvores altas.
- É onívora e sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, bagas, pequenos répteis e ovos de outras espécies de pássaros.
- O ninho é feito com gravetos apoiados em galhos mais grossos.
- A incubação varia de 16 a 18 dias.
- A reprodução é dada de forma cooperativa.
- Várias fêmeas podem botar seus ovos em um mesmo ninho e quase todos os indivíduos ajudam na proteção e alimentação dos filhotes.

# CORUJA-SUINDARA



Nome científico: *Tyto alba*

Distribuição: América do Norte e Sul, Europa, Sul e Sudeste da Ásia e toda Austrália.

Habitat: Florestas, campos, cerrados e na cidade.

Comportamento: Solitária.

Longevidade: 10 a 20 anos.

Incubação: 30 a 34 dias.

Nº de ovos: 3 a 6.

Peso Adulto: 470 a 570 gramas

Alimentação na Natureza: Carnívoro: pequenos animais e insetos.

# CORUJA-SUINDARA



- Conhecidas também como Coruja-da-Igreja.
- A Suindara é uma das espécies com maior distribuição geográfica do mundo.
- Seu hábito é totalmente noturno, durante o dia se quer abrem os olhos.
- Alimentam-se de serpentes e pequenos roedores.
- O formato e o desenho das penas que cobrem seu rosto tem a função de levar o som direto para seus ouvidos.
- Como todas as corujas, ingere o alimento inteiro. No estômago, há a separação dos pelos, ossos e outras partes não digeríveis, as quais formam pelotas, posteriormente regurgitadas.

# CORUJA-ORELHUDA



Nome científico: *Rhynoptynx clamator*

Distribuição: Venezuela, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil.

Habitat: Arvoredos, cerrados, caatingas e dentro das cidades.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 10 a 20 anos.

Incubação: 25 a 33 dias.

Nº de ovos: 2 a 4.

Peso Adulto: 320 a 546 gramas

Alimentação na Natureza: Carnívoros: pequenos animais, incluindo anfíbios, reptéis e insetos.

# CORUJA-ORELHUDA



- Apesar de seu nome ser Coruja Orelhuda, elas não possuem orelha, mas sim ouvidos com uma ótima audição, sendo melhor que do ser humano.
- Quando ameaçadas levantam as asas e arrepiam todas as penas, tentando mostrar superioridade no tamanho.
- Costumam comer ratos e baratas controlando a população desses animais que são considerados pragas para o ser humano.
- Aos 130 -140 dias de vida os jovens são expulsos do território pelos pais. Frequentemente apenas um filhote é criado.

# MURUCUTUTU-DE-BARRIGA-AMARELA



Nome científico: Pulsatrix koeniswaldiana

Distribuição: Sul da Bahia ao Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina.

Habitat: Florestas e beira de matas.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 10 a 20 anos.

Incubação: 28 a 30 dias.

Nº de ovos: 01 a 02.

Peso Adulto: 400 a 600 g

Alimentação na Natureza: Insetos e pequenos vertebrados.

# MURUCUTUTU-DE-BARRIGA-AMARELA



- Espécie florestal que habita o interior de florestas úmidas primárias, secundárias e suas bordas, podendo inclusive se aventurar em clareiras e outras áreas com árvores esparsas.
- Ocupa ocos de árvores para nidificar. O macho é responsável por trazer alimento para a fêmea e para os filhotes. A época de reprodução acontece com a chegada da primavera e verão, quando as temperaturas são mais amenas e o alimento mais abundante.
- Caça somente durante a noite, procurando por insetos grandes, aves dormindo e especialmente roedores e outros mamíferos de pequeno e médio porte.

# CORUJA-BURAQUEIRA



Nome científico: *Speotyto cunicularia*

Distribuição: Estados Unidos, América Central e do Sul.

Habitat: Campos, pastos e restinga.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 10 anos.

Incubação: 28 a 30 dias.

Nº de ovos: 6 a 9.

Peso Adulto: 150 a 215 gramas

Alimentação na Natureza: Carnívoro: pequenos animais e insetos.

# CORUJA-BURAQUEIRA



- As corujas são as únicas aves que possuem os olhos na parte frontal da face.
- São ótimas caçadoras e escutam muito bem.
- A coruja buraqueira adquiriu esse nome pois vivem em tocas e buracos feitos em beira de estrada e gramados.
- Quando ameaçadas fogem, mas quando próxima de sua toca atacam com sua garras.
- É uma predadora de pequeno porte com hábito carnívoro-insetívoro, considerada generalista por consumir as presas mais abundantes de acordo com a estação, tendo preferência por roedores.

# CORUJINHA-DO-MATO



Nome científico: *Megascops choliba*

Distribuição: Todo território brasileiro.

Habitat: Comum em cidades, parques urbanos e fazendas, beira das matas secas ou úmidas.

Comportamento: Hábitos noturnos.

Longevidade: 18 anos.

Incubação: 26 dias.

Número de ovos: 1 a 4 ovos.

Peso adulto: 96 a 160 g

Alimentação na natureza: Grandes insetos.

# CORUJINHA-DO-MATO



- A corujinha-do-mato é a mais comum.
- Ela mede 22 cm, ainda menor do que a coruja-buraqueira.
- Destaca-se em sua silhueta, as duas "orelhas" nos lados da cabeça.
- Os olhos são amarelados destacados na face cinza clara. A corujinha-do-mato possui hábito estritamente noturno e, quase sempre, é encontrada empoleirada em árvores.
- Ela busca abrigo diurno em buracos de árvores, como aqueles feitos por pica-paus ou em cupinzeiros.

# EMA



Nome científico: *Rhea americana*

Distribuição: Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai e Brasil.

Habitat: Cerrado, região noroeste e centro-oeste do Brasil.

Comportamento: Vive em grupos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 21 a 41 dias.

Nº de ovos: 20 a 50 por ano.

Peso adulto: 32 a 35 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: pequenos animais, insetos, sementes, grãos, folhas e frutos.

# EMA



- É a maior ave do Brasil, a segunda maior ave do mundo. Apesar de ser uma ave ela não voa.
- O macho é quem recolhe todos os ovos botados pelas fêmeas, é ele quem choca os ovos da ninhada além de fazer o buraco do ninho.
- Seu comportamento varia por indivíduo, geralmente os machos são mais agressivos que as fêmeas.
- Se mostram irritados abrindo as asas, levantando toda sua plumagem e abrindo a boca.
- É uma ave corredora e usa as asas para equilibrar-se e mudar de direção na corrida.

# MAMÍFEROS



# QUEIXADA



Nome científico: *Tayassu pecari*

Distribuição: Sul dos Estados Unidos, América Central e Brasil.

Habitat: Florestas e cerrados.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 10 a 12 anos.

Gestação: 160 dias.

Nº de Filhotes: 1 a 2.

Peso Adulto: 25 a 40 kg

Alimentação na Natureza: Herbívoros: folhas, frutos, raízes e grãos.

# QUEIXADA



- São animais muito agressivos e territorialistas.
- Possuem uma mordida potente.
- Seu nome provém do barulho que sua boca produz batendo a maxila na mandíbula.
- Os homens caçam esses animais por esporte e troféus.
- Vive em bandos que chegam a somar mais de trezentos indivíduos.
- Esse animal é amplamente considerado perigoso, e atacam de forma agressiva qualquer inimigo, se acuados e, quando um deles está ferido, é comum todo o bando voltar-se para defendê-lo.

# CACHORRO-DO-MATO



Nome científico: *Cerdocyon thous*

Distribuição: América do Sul exceto na Amazônia.

Habitat: Campos e Cerrados.

Comportamento: Solitário, apenas em época de reprodução é visto aos pares.

Longevidade: 9 anos.

Gestação: 56 dias.

Número de filhotes: 3 a 6 filhotes.

Peso adulto: Entre 4,5 e 8,5 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: frutos, pequenos mamíferos, insetos, aves, répteis e anfíbios.

# CACHORRO-DO-MATO



- É um animal territorialista, pode viver em bandos, porém é um caçador solitário e raramente procuram alimento aos pares.
- É o canídeo brasileiro mais avistado, comum em áreas rurais e de matas próximas aos centros urbanos.
- Possuem pêlos acinzentados, a região ventral tendendo ao amarelado, as pontas das patas são pretas, possuem orelhas curtas e uma cauda bem peluda.
- A principal ameaça são doenças infectocontagiosas transmitidas por cães domésticos.

# RAPOSINHA-DO-CAMPO



Nome científico: *Lycalopex vetulus*

Distribuição: Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás, sul e oeste da Bahia e oeste do Piauí.

Habitat: Cerrado, sertão e savanas com árvores dispersas.

Comportamento: Ativas à noite e durante o crepúsculo.

Bandos de 03 a 12 indivíduos.

Longevidade: 13 anos.

Gestação: 2 meses.

Número de filhotes: 2 a 4 filhotes.

Peso adulto: 3 a 4 kg

Alimentação na natureza: Frutos, pequenas aves, roedores, gafanhotos e besouros-do-esterco.

# RAPOSINHA-DO-CAMPO



- A pelagem é curta com coloração cinza claro nas porções dorsais e cinza-amarelado nas porções ventrais, entretanto a coloração varia ao longo de sua distribuição.
- As orelhas e patas são levemente avermelhadas.
- Espécie endêmica do Brasil vive na região central do país em áreas de cerrado.
- A espécie é bem adaptável e pode ser encontradas em pastagens para o gado e plantações.
- Noturna, vive solitária, podendo ser observada em casais na época de reprodução.
- Os impactos da expansão urbana é uma ameaça para a espécie.

# IRARA



Nome científico: *Eira barbara*

Distribuição: Região costeira do México até o norte da Argentina.

Habitat: Florestas e campos.

Comportamento: Hábitos solitários.

Longevidade: 12 anos.

Gestação: 65 dias.

Número de filhotes: 2 filhotes.

Peso adulto: 2,7 a 7 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: macacos, roedores, aves, ovos, lagartos, insetos, frutos e mel.

# IRARA



- Predominantemente diurna, porém com atividade noturnal ocasional.
- De hábitos solitários, podendo ser observadas aos pares.
- Possui grande agilidade, podendo nadar e escalar com facilidade faz tocas em ocos de árvores.
- É considerado um dos predadores de médio-porte mais abundantes onde ocorre.
- O desmatamento é a principal ameaça à espécie.
- Possui uma dieta mista de vertebrados.
- Sua dieta onívora significa que nas áreas rurais eles são conhecidos por gostarem de frutas, principalmente o mamão.

# SAGÜI-DE-MÃOS-DOURADAS



Nome científico: *Saguinus midas*

Distribuição: Floresta Amazônicas.

Habitat: Florestas úmidas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 10 a 12 anos.

Gestação: 140 a 150 dias.

Nº de Filhotes: 1 a 3.

Peso Adulto: 430 a 450 g

Alimentação na Natureza: Onívoros: frutos, insetos, pequenos invertebrados e seiva de plantas.

# SAGÜI-DE-MÃOS-DOURADAS



- Se distinguem das outras espécies por suas patas apresentarem a coloração dourada.
- Dorme nas árvores durante a noite e passa o dia procurando comida entre os galhos, alimentando-se de frutos e insetos.
- Geralmente a fêmea dá a luz à gêmeos e os carrega nas costas e no peito.
- É muito procurado pelos caçadores para artesanatos, como chaveiros com suas patas.
- Sem dúvida é uma das espécies de sagüi mais amplamente distribuídas.

# SAGÜI-DE-CARA-BRANCA



Nome científico: *Callithrix geoffroyi*

Distribuição: Desde o Espírito Santo até o norte do rio Paraíba e oeste de Minas Gerais.

Habitat: Caatinga e Cerrados em formações arbóreas baixas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 10 a 15 anos.

Gestação: 140 a 150 dias.

Nº de Filhotes: 1 a 2.

Peso Adulto: 300 a 350 g

Alimentação na Natureza: Onívoro: néctar, flores, frutos, seivas, insetos e pequenos animais.

# SAGÜI-DE-CARA-BRANCA



- São extremamente ágeis e rápidos.
- Possuem um cheiro muito forte na urina.
- Tem um grito muito agudo para chamar todo o bando.
- O macho auxilia a fêmea no parto comendo sua placenta e cortando seu cordão umbilical, e também carrega os filhotes em suas costas.
- É um animal arborícola e sua cauda serve para se equilibrar de uma árvore para outra.
- O dedo polegar da mão desses animais é muito curto e as unhas têm forma de garras, o que os ajudam a fixarem nas árvores e se alimentarem.

# CATETO



Nome científico: *Tayassu tajacu*

Distribuição: Sul dos Estados Unidos até o Brasil.

Habitat: Florestas e cerrados.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 15 anos.

Gestação: 142 a 148 dias.

Nº de Filhotes: 1 a 4.

Peso Adulto: 17 a 30 kg

Alimentação na Natureza: Herbívoros: folhas, frutos, raízes e grãos.

# CATETO



- Geralmente não são tão agressivos quanto a queixada.
- Possuem um pelo grosso e denso.
- A estrutura dos dentes e a divisão do seu estômago em compartimentos são semelhantes a de animais ruminantes.
- Suas patas traseiras tem um dedo a menos.
- Nas florestas tropicais são essencialmente frugívoros (frutas e sementes).
- Conhecidos também como Caititus, não habitam áreas de altitudes elevadas.

# PACA



Nome científico: *Agouti paca*

Distribuição: América Central e América do Sul.

Habitat: Vivem em áreas de mata próximos a pequenos cursos d'água.

Comportamento: Animais solitários.

Longevidade: 18 anos.

Gestação: 120 dias.

Número de filhotes: 1 a 2 filhote por ano.

Peso adulto: 6 e 12 kg

Alimentação na natureza: Herbívoros.

# PACA



- Importante dispersor de sementes.
- A alimentação varia conforme a época e disponibilidade de alimentos.
- Noturna, passam o dia em suas tocas e saem a noite para se alimentarem.
- São animais solitários, encontrando outros de sua espécie apenas na época de reprodução.
- Tem preferência por viverem próximos a corpos d'água porque os utiliza como rota de fuga de predadores e caçadores.
- A paca possui 4 dedos nas patas dianteiras e 5 nas traseiras.

# CUTIA



Nome científico: *Dasyprocta aguti*

Distribuição: Nordeste, litoral brasileiro e sul da América Central.

Habitat: Florestas, cerrados, capoeiras e caatingas.

Comportamento: Vivem em populações, geralmente de 1 macho para 6 fêmeas.

Longevidade: 10 a 14 anos.

Gestação: 104 a 120 dias.

Número de filhotes: 1 a 3 filhotes.

Peso adulto: 1,5 a 3 kg

Alimentação na natureza: Herbívoro, sementes e frutas

# CUTIA



- Vivem em lugares úmidos apropriados, em baixas altitudes, em florestas secas e verdes.
- As cutias dão a luz precocemente, parindo entre um e dois filhotes. Pode ocorrer até duas gestações por ano.
- A cutia enterra o alimento em diversos locais dentro do seu território, e na época de escassez ela desenterra o que foi anteriormente estocado.
- O sistema de comunicação entre cutias é feito principalmente pelo olfato e pela audição.
- Os membros anteriores são bem menores do que os posteriores e exibem quatro dedos funcionais utilizados para levar o alimento à boca.

# VEADO CATINGUEIRO



Nome científico: *Mazama gouazoubira*

Distribuição: Panamá, Colômbia, Venezuela, Peru, Argentina e Brasil.

Habitat: Florestas tropicais.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 13 anos.

Gestação: 225 dias.

Nº de filhotes: 01.

Peso adulto: 8 a 25 kg

Alimentação na natureza: Herbívoro: folhas, brotos e gramíneas.

# VEADO CATINGUEIRO



- São muito frágeis.
- Quando filhotes apresentam pintas ou manchas brancas para a camuflagem, e a medida em que vão se tornando adultos essas manchas somem, pois já são capazes de se defender.
- Apenas os machos apresentam um par de chifre. Essa espécie ficou bastante conhecida nos desenhos animados com o BAMBI.
- Dado sua alta adaptabilidade, o veado-catingueiro pode habitar áreas altamente modificadas pelo homem, e pode ocorrer mesmo em monoculturas agrícolas como canaviais.

# JAGUATIRICA



Nome científico: *Leopardus pardalis*

Distribuição: Sudoeste dos Estados Unidos, México, Argentina e Brasil.

Habitat: Cerrado, caatinga, pantanal, florestas tropicais e subtropicais.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 21 anos.

Gestação: 70 a 85 dias.

Nº de filhotes: 02 a 04.

Peso adulto: 08 a 10 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: mamíferos de pequeno a médio porte e peixes.

Ameaçado  
de Extinção

# JAGUATIRICA



- É um felino de médio porte, chegando a pesar quando adulto 15kg.
- São ágeis e caçam durante a noite, pois enxergam muito bem na escuridão.
- São animais carnívoros alimentando-se de peixes, aves e mamíferos de pequeno porte como os roedores.
- São ótimas nadadoras e escalam árvores com muita facilidade.
- É muito caçada para venda de sua pele, e com a destruição de seu habitat a jaguatirica está hoje ameaçada de extinção.

Ameaçado  
de Extinção

# GATO-MOURISCO



Nome científico: *Puma yagouaroundi*

Distribuição: Sul do Texas até a América do Sul

Habitat: Áreas de várzeas perto de fontes de água corrente, encontrados nas planícies, eles são relatados em altitudes elevadas a cerca de 3.200 m.

Comportamento: Hábitos noturnos e vivem em casais.

Longevidade: 10 anos.

Gestação: 70 a 75 dias.

Nº de filhotes: 1 a 4 .

Peso adulto: 3 a 9 kg

Alimentação na natureza: Roedores, pequenos répteis e aves. Também se alimentam de uma pequena quantidade de vegetação e artrópodes.

# GATO-MOURISCO



- Este felino tem aparência bastante distinta. Possui coloração variando do preto ou castanho escuro ao avermelhado.
- Os indivíduos de coloração mais escura estão comumente associados as florestas enquanto que os mais claros são encontrados em ambientes mais secos.
- Como é ativo durante o dia, é um dos felinos mais comumente visualizados, no entanto, não é abundante em nenhum lugar.
- Este felino não é muito procurado por sua pele, mas está sofrendo declínio devido à perda de habitat.
- Também conhecido como Jaguarundi.

# GATO DO MATO PEQUENO



Nome científico: *Leopardus tigrinus*

Distribuição: Costa Rica, Argentina e Brasil.

Habitat: Mata e zona rural.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 15 anos.

Gestação: 70 dias.

Nº de filhotes: 01 a 02.

Peso adulto: 2 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: mamíferos de pequeno porte e insetos.

Ameaçado  
de Extinção

# GATO DO MATO PEQUENO



- Um dos oito felinos brasileiros ameaçados de extinção devido a destruição do habitat.
- São ágeis e caçam com muita cautela, se alimentando de pequenos mamíferos, aves e répteis.
- Devido a sua pele muito bonita, são bastantes perseguidos por caçadores.
- São inofensivos ao homem, mas defendem-se ferozmente quando ameaçados.
- Populações estão sendo severamente reduzidas pela conversão do habitat para plantações e pastagens.

Ameaçado  
de Extinção

# LEÃO



Nome científico: *Phantera leo*

Distribuição: África.

Habitat: Savanas africanas.

Comportamento: solitário.

Longevidade: 17 a 20 anos.

Gestação: 110 a 119 dias.

Nº de filhotes: 02 a 06.

Peso adulto: 120 a 250 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: mamíferos de pequeno a grande porte, variadas aves e répteis.

# LEÃO



- Animal Africano que vive em bandos com um macho dominante, as fêmeas e seus filhotes.
- Se um macho solitário vencer a luta com um macho dominante de um bando, ele assume o bando e mata toda a cria do macho derrotado para que apenas os seus descendentes sobrevivam.
- Um Leão solitário pode passar 3 a 4 dias sem alimento, quando capturam uma presa, comem de 30kg a 40kg de carne numa única refeição.
- Leões rugem, e essa vocalização tem vários significados, como demarcação de território. E para a fêmea, proteção do bando e imposição da sua presença.

# FURÃO



Nome científico: *Galictis cuja*

Distribuição: Sul do México, passando por Bolívia e Brasil.

Habitat: Vivem em troncos de árvores, rochas ou em tocas que cavam.

Comportamento: Solitários ou grupos familiares.

Longevidade: 10 anos.

Gestação: 40 dias.

Nº de filhotes: 1 a 4.

Peso adulto: 2 a 4 kg

Alimentação na natureza: Pequenos mamíferos, aves e seus ovos, répteis, anfíbios, insetos e frutos.

# FURÃO



- Possui hábitos diurnos e noturnos
- Pode ser visto solitário e em grupos familiares.
- Fazem tocas entre rochas, ocos de árvores ou escavadas.
- Possuem um corpo alongado e pernas curtas, dotados de grande agilidade podem nadar e escalar com facilidade.
- Se comunicam através de vocalizações
- Possui ampla distribuição, e parecem resistentes aos impactos da fragmentação florestal.
- A pelagem é bastante característica, com a face, região da garganta e os membros negros e o dorso acinzentado.
- Uma faixa branca faz a divisa das duas cores.

# PORQUINHO-DA-ÍNDIA



Nome científico: *Cavia porcellus*

Distribuição: Noroeste da Venezuela, Peru e região norte e central do Chile.

Habitat: Capoeiras, capinzais e vegetações baixas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 7 anos.

Gestação: 68 dias.

Nº de Filhotes: 1 a 13.

Peso Adulto: 600 g

Alimentação na Natureza: Herbívoro: brotos, capins, verduras, tubérculos e legumes.

# PORQUINHO-DA-ÍNDIA



- São vivazes e dóceis, raramente mordendo, a menos que se sintam ameaçados ou perturbados.
- Adaptam-se bem ao cativeiro e são alimentados com ração de coelho, feno, capim, legumes (alface em pouca quantidade e não frequente, pois pode lhe causar diarreia e até levar à morte) e frutas frescas.
- Este animal adapta-se facilmente a qualquer ambiente, exigindo apenas um local bem seco.
- Basta um espaço onde possa organizar a sua rotina diária composta de passeios e brincadeiras além da higiene própria.

# ONÇA PARDÁ



Nome científico: *Puma concolor*

Distribuição: Oeste do Canadá à América do Sul.

Habitat: Florestas, cerrados e montanhas.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 20 a 25 anos.

Gestação: 111 dias.

Nº de filhotes: 02 a 03.

Peso adulto: 50 a 90 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: mamíferos de pequeno à grande porte e aves.

Ameaçado  
de Extinção

# ONÇA PARDÁ



- A Onça Parda é também conhecida como Suçuarana ou Puma.
- É um dos maiores felinos das Américas, perdendo no tamanho somente para a Onça Pintada.
- Consegue ficar à vontade em cima das árvores, equilibrando-se com a cauda felpuda ao saltar de galho em galho.
- É um animal solitário e prefere viver em regiões montanhosas.
- Os adultos se comunicam por meio de uma espécie de silvo estridente, e os filhotes ficam com as mães até os 20 meses.

Ameaçado  
de Extinção

# ONÇA PINTADA



Nome científico: *Panthera onca*

Distribuição: Américas do Sul e Central.

Habitat: Matas fechadas, cerrado, pantanal e caatinga.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 20 a 30 anos.

Gestação: 90 a 111 dias.

Nº de filhotes: 01 a 04.

Peso adulto: 150 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: mamíferos de pequeno à grande porte, aves e peixes.

Ameaçado  
de Extinção


# ONÇA PINTADA



- A Onça Pintada é o maior felino das Américas. São animais robustos e musculosos, podendo chegar a 150 kg.
- São animais de hábito noturno e solitário, raramente caçam durante o dia.
- As onças urinam com grande frequência para demarcação de território.
- São ótimas saltadoras e nadam extremamente bem.
- No período de reprodução os casais caçam em conjunto, um ajuda o outro.
- Sua dieta é bem diversificada, se alimentando de pequenos pássaros, mamíferos e répteis.

Ameaçado  
de Extinção

# MACACO PREGO



Nome científico: *Cebus apella*

Distribuição: Colômbia, Venezuela, Paraguai, Brasil e norte da Argentina.

Habitat: Florestas.

Comportamento: Vive em grupos.

Longevidade: 45 anos.


Gestação: 150 a 180 dias.

Nº de filhotes: 01 a 02.

Peso adulto: 1,7 a 4,5 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: frutos, legumes, folhas, grãos, pequenos animais, insetos e ovos.

# MACACO PREGO



- São animais territorialistas e andam em bandos.
- Tem a característica de serem agressivos e extremamente espertos.
- Galhos e pedras são ferramentas muito úteis para essa espécie de macaco, que usam para cortar, rasgar e defender-se de predadores ou algo que os ameacem.
- Quando se movimenta, mantém a cauda para cima, enrolada como um ponto de interrogação.
- Eles identificam os companheiros pelo cheiro, mas também usam outros sentidos.
- O nome Macaco Prego vem do formato de seu pênis, muito parecido com um prego.

# CACHORRO DO MATO VINAGRE



Nome científico: *Speothos venaticus*

Distribuição: América do Sul.

Habitat: Florestas e savanas úmidas.

Comportamento: Vive em grupos.

Longevidade: 10 anos.

Gestação: 67 dias.

Nº de filhotes: 01 a 06.

Peso adulto: 7 kg

Alimentação na natureza: Carnívoro: pacas, cotias, capivaras, emas, pequenos animais e ovos.

Ameaçado  
de Extinção


# CACHORRO DO MATO VINAGRE



- São os menores cães silvestre do Brasil.
- Nos zoológicos são construídos recintos especiais para o cachorro vinagre, pois como tem o costume de fazer tocas e buracos para se abrigar e se esconder de predadores, podem cavar um buraco dentro do recinto com saída para fora.
- Após o nascimento dos filhotes, os machos tem a obrigação de buscar comida para a prole, visto que a fêmea cuida dos filhotes enquanto o macho esta fora.
- São carnívoros alimentando-se de capivaras, cotias, emas e pequenos animais.

Ameaçado  
de Extinção

# BUGIO PRETO



Nome científico: *Alouatta caraya*

Distribuição: Bahia ao Rio Grande do Sul.

Habitat: Ambientes florestais, incluindo matas ciliares e cerrado.

Comportamento: Vive em grupos.

Longevidade: 20 anos.

Gestação: 180 a 194 dias.


Nº de filhotes: 01.

Peso adulto: 7 kg

Alimentação na natureza: Herbívoro: folhas e frutos.

Ameaçado  
de Extinção

# BUGIO PRETO



- Os Bugios são encontrados em toda a Mata Atlântica.
- Vivem sempre em bandos e existe cooperação entre os grupos.
- Os filhotes tem o costume de grudar nas costas da mãe para se locomoverem com segurança.
- Não possuem muita agilidade para pular e segurar em outro lugar.
- Esse animal tem como principal característica a sua vocalização que é extremamente forte e grave.
- Com o vasto desmatamento do Mata Atlântica os Bugios estão ameaçados de extinção.

Ameaçado  
de Extinção

# LOBO-GUARÁ



Nome científico: *Chrysocyon brachyurus*

Distribuição: Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai.

Habitat: Vive nos cerrados.

Comportamento: Esta espécie não forma alcateias e tem hábitos solitários, juntando-se apenas em casais durante a época de reprodução.

Longevidade: 12 a 15 anos.

Gestação: 65 dias.

Número de filhotes: 3 filhotes.

Peso adulto: 25 kg

Alimentação na natureza: Onívoro. Insetos, répteis, aves e pequenos mamíferos.

Ameaçado  
de Extinção

# LOBO-GUARÁ



- Se alimentam de muitos frutos, como a "fruta-do-lobo", da qual o lobo-guará é o principal dispersor de sementes.
- Com frequência se acasalam com o mesmo parceiro ano após ano, o macho auxilia na criação no início do desenvolvimento da prole.
- As principais ameaças são a perda de habitat para agricultura, fragmentação e isolamento de subpopulações.
- Estes animais são bastante dependentes da lobeira (*Solanum lycocarpum*), e estabelecem uma relação simbiótica: sem os frutos da lobeira, o lobo-guará morre de complicações renais causadas por nematódeos.

Ameaçado  
de Extinção

# CERVO DO PANTANAL



Nome científico: *Blastocerus dichotomus*

Distribuição: Pantanal Mato-grossense.

Habitat: Pântanos com vegetação alta e bem cerrada.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 15 a 25 anos.

Gestação: 210 dias.

Nº de Filhotes: 1.

Peso Adulto: 120 kg

Alimentação na Natureza: Herbívoros: gramíneas e folhagens.

Ameaçado  
de Extinção

# CERVO DO PANTANAL



- É o maior cervídeo da América do Sul.
- É um animal muito arisco que se assusta facilmente.
- Tem um chifre muito potente.
- Está ameaçado de extinção devido a caça ilegal e destruição de seu habitat.
- A marcação no Livro de Registro Genealógico, que contém todas as informações do animal, é feita de 1 a 3 meses de idade, onde é colocado um brinco com uma numeração.
- Os machos possuem chifres ramificados, enquanto as fêmeas não.

Ameaçado  
de Extinção

# QUATI



Nome científico: *Nasua nasua*

Distribuição: América do Norte, Central e do Sul.

Habitat: Florestas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 7 a 8 anos.

Gestação: 10 a 11 semanas.

Nº de Filhotes: 2 a 7.

Peso Adulto: 3 a 7 kg

Alimentação na Natureza: Onívoros: pequenos animais, peixes, aves, ovos e frutos.

# QUATI



- Animais que possuem uma grande quantidade de pelos grandes e densos.
- Suas garras longas e fortes servem para viver em árvores, e com a ajuda do seu focinho, em forma de trombeta, ajudam-no a escavar por toda a parte a procura de alimento.
- Geralmente tem comportamento bem passivo e não costuma atacar humanos.
- Uma curiosidade é que os índios fazem dos Quatis seus animais de estimação, que por sinal são muito dóceis e carinhosos.

# BUGIO MARROM



Nome científico: *Alouatta fusca*

Distribuição: Ocorrem desde as matas costeiras do sul do México até o sudeste brasileiro.

Habitat: Uma variedade de ambientes que vai da floresta tropical úmida aos campos cerrados.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 20 anos.

Gestação: 4 a 5 meses.

Nº de filhotes: 1.

Peso adulto: 120 a 130 kg

Alimentação na natureza: Folhas e frutas.

Ameaçado  
de Extinção

# BUGIO MARROM



- A pelagem é marrom escura, próxima do preto, e uma barba reveste o queixo.
- Um dos maiores primatas do continente.
- Pouco ativo, passa a maior parte do dia em repouso.
- Vive em bandos de sete indivíduos em média.
- O grupo é liderado pelo macho mais velho, chamado de capelão.
- Este é responsável pela segurança do grupo, principalmente nas raras vezes em que descem ao chão.
- Após seis meses de gestação, nasce apenas um filhote, que fica sob os cuidados da mãe por cerca de um ano.

Ameaçado  
de Extinção

# OURIÇO-CACHEIRO



Nome científico: *Coendou prehensilis*

Distribuição: América do sul.

Habitat: Cerradão, mata, mata ciliar, veredas e ambientes alagados.

Comportamento: É um animal solitário e territorial, de hábitos essencialmente noturnos.

Longevidade: 7 a 10 anos.

Gestação: 12 a 13 semanas.

Nº de filhotes: 4 a 6.

Peso adulto: 700g a 1 kg

Alimentação na natureza: Minhocas, escaravelhos, lagartas, aranhas, lesmas, aves pequenas.

# OURIÇO-CACHEIRO



- O ouriço é um animal arborícola, possuindo cauda preênsil e unhas fortes para melhor locomoção entre os galhos.
- Seu hábito na natureza varia entre crepuscular e noturno e são animais solitários.
- É um roedor tímido e inofensivo, porém sua estratégia de defesa são os espinhos que possui em toda região dorsal.
- Ao contrário de que se normalmente imagina, eles não são capazes de lançá-los, mas em situação de perigo eles encolhem o corpo e eriçam os espinhos.
- Devido à grande degradação de seu habitat, são muito encontrados em florestas secundárias, em bordas de mata e até em regiões urbanas.

# MACACO-ARANHA-DE-TESTA-BRANCA



Nome científico: *Ateles belzebuth marginatus*

Distribuição: Floresta Amazônica.

Habitat: Florestas altas chuvosas inundáveis ou terra firme.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 30 a 35 anos.

Gestação: 210 a 232 dias.

Nº de Filhotes: 1.

Peso Adulto: 7,5 a 8,0 kg

Alimentação na Natureza: Frugívoro: frutos, folhas, sementes, brotos, néctar e casca de árvores.

Ameaçado  
de Extinção

# MACACO-ARANHA-DE-TESTA-BRANCA



- Seu nome provem de suas habilidades em trepar em árvores movendo-se com grande rapidez.
- Com muita agilidade lembrando uma aranha em sua teia, usando também sua cauda como um quinto membro que é preênsil (pode enrolar-se e desenrolar-se a fim de usar como se fosse seu braço e mão).
- Quando sexualmente maduras as fêmeas tendem a migrar para outros grupos
- É considerado o maior primata da América do Sul.
- Formam grupos de até 30 indivíduos.

Ameaçado  
de Extinção

# MANGABEI



Nome científico: *Cercocebus aterrimus*

Distribuição: É encontrado na costa oeste da África e região central.

Habitat: Habitam selvas húmidas, selvas de pântanos, vegetações secundárias e plantações.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 30 anos.

Gestação: 170 dias.

Nº de filhotes: 1 a 3.

Peso adulto: 9 a 10 kg machos e 7.5 a 8.6 kg as fêmeas.


Alimentação na natureza: Consiste principalmente em polpa de frutos, comendo eventualmente pequenos animais invertebrados e argila.

# MANGABEI



- São animais diurnos, dormindo à noite nos ramos mais altos das árvores.
- São sociáveis entre si, vivendo em grupos.
- Os molares desta espécie são longos e os incisivos são muito grandes.
- Não há época para procriação.
- Os filhotes nascem durante o ano inteiro.
- Quando crescem, formam um grupo separado, vivendo a distancia dos adultos.
- As fêmeas limpam o pelo dos machos, removendo os parasitas que provocam coceira.
- São macacos robustos e pesados, muito próximos dos babuínos e mandris.

# RÉPTEIS



# IGUANA



Nome científico: *Iguana iguana*

Distribuição: Califórnia e América Central.

Habitat: Florestas fechadas, cerrado e caatinga.

Comportamento: Solitário.

Longevidade: 12 a 13 anos.

Incubação: 60 a 85 dias.

Nº de ovos: 15 a 25.

Peso adulto: 4,5 a 6,8 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: frutos, folhas, insetos, animais de pequeno porte e ovos.

# IGUANA



- É um réptil arborícola, ou seja, vive a maior parte de sua vida em galhos e árvores.
- A Iguana tem uma alimentação diferente quando jovem, alimentando-se de insetos, moluscos e animais recém nascidos de pequeno porte.
- Quando adulta se alimenta de frutas, folhas em geral e flores.
- Se camuflam muito bem nos galhos das árvores.
- Possuem uma cauda extremamente poderosa e equivale a dois terços de seu corpo.
- Quando jovens possui coloração intensa.

# JABUTI PIRANGA



Nome científico: *Geochelone carbonaria*

Distribuição: Centro-oeste, nordeste, sudeste e sul do Brasil.

Habitat: Florestas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 80 anos.

Incubação: 6 a 9 meses.

Nº de ovos: 5 a 10.

Peso Adulto: 10 a 18 kg

Alimentação na Natureza: Onívoro: vegetais, frutos, pequenos animais e insetos.

# JABUTI PIRANGA



- O jabuti possui uma carapaça formada por duas partes: casco e plastrão.
- Recolhe as pernas e a cabeça no casco para se proteger.
- Suas patas são específicas para movimentar-se melhor na terra do que na água, diferente das tartarugas que possuem nadadeiras ou membranas interdigitais.
- São muito confundidos com os cágados por terem a mesma fisionomia, mas são animais com características muito diferentes.

# JABUTI TINGA



Nome científico: *Chelonoidis denticulata*

Distribuição: América do Sul.

Habitat: Florestas tropicais densas, caatingas e campos.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: Ultrapassa os 100 anos.

Incubação: 6 a 9 meses.

Nº de ovos: 6 a 16.

Peso Adulto: 10 a 18 kg

Alimentação na Natureza: Onívoro: vegetais, frutos, pequenos animais e insetos.

# JABUTI TINGA



- Possui cores mais opacas e é maior do que o jabuti piranga.
- Atinge cerca de 70 centímetros e 80 anos de vida em média, porém podem ultrapassar 1 metro de comprimento de carapaça chegando a pesar quase 60 quilos.
- Esses répteis são onívoros e 85% de sua dieta são de vegetais, frutas e folhas que caem das árvores. E 15% de sua dieta são de insetos, minhocas e pequenos animais.
- A sua carapaça é rígida.
- Além do tráfico de animais o jabuti tinga está sofrendo com o desmatamento de seu habitat natural.

# PÍTON



Nome científico: *Python molurus*

Distribuição: Ásia e Índia.

Habitat: Florestas Úmidas, Campos e regiões de pântano.

Comportamento: Movimenta-se devagar.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 120 a 240 dias.

Nº de ovos: Cerca de 100.

Peso Adulto: 40 a 52 kg

Alimentação na Natureza: Carnívoro: mamíferos, aves, répteis.

# PÍTON



- A Píton pode engolir uma presa maior que seu diâmetro, pois seus ossos da mandíbula não estão conectados. Assim, se alongando suficientemente para engolir um cervo inteiro.
- A presa não consegue escapar após ser mordida, pois seus dentes são inclinados na posição contrária.
- Após se alimentar, a cobra não pode se mover até digerir o alimento, pois caso o faça, o animal dentro dela pode perfurar o seu couro.

# JIBOIA



Nome científico: *Boa constrictor*

Distribuição: América do Sul e Central.

Habitat: Matas, cerrados e caatingas.

Comportamento: Hábitos noturnos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 127 a 249 dias.

Número de ovos: 8 a 49.

Peso adulto: 40 kg

Alimentação na natureza: Carnívoros.

# JIBOIA



- É totalmente inofensiva apesar de morder quando se sente ameaçada.
- Quando irritada expira o ar dos pulmões com violência, que ao passar pela glote faz um ruído característico o “Bafo da Jibóia”.
- Mata suas presas por constrição (estrangulamento).
- Apesar de não ser peçonhenta sua mordida pode causar sérias infecções, devido a quantidade de bactérias presentes em sua cavidade oral.
- Quando filhotes são arborícolas, mas à medida que se desenvolvem passam a viver no solo.

# CANINANA



Nome científico: *Spilotes pullatus*

Distribuição: América do Sul e a América Central.

Habitat: Mata Atlântica e Cerrado.

Comportamento: Possui hábitos solitários

Longevidade: 17 anos

Incubação: 73 dias.

Nº de ovos: 8 a 15.

Peso adulto: 25 kg

Alimentação na natureza: Roedores arborícolas, aves e pequenos lagartos.

# CANINANA



- A caninana é bastante rápida e ágil.
- Alimenta-se principalmente de roedores arborícolas e pequenas aves.
- Característica da América Central e América do Sul. Adapta-se bem aos ambientes degradados.
- É considerada uma serpente agressiva, e quando molestada infla o pescoço, arma o bote e pode atacar seu oponente mordendo-o.
- Quando avistada pelo homem ela sempre foge, como a maioria das serpentes fazem na presença de humanos.
- Devora o alimento inteiro para fazer a digestão com ácidos de seu sistema digestivo.

# SUAÇUBOIA



Nome científico: *Corallus hortulanus*

Distribuição: Amazônia, Equador, Peru, até o sul da Colômbia.

Habitat: Mata amazônica e mata atlântica.

Comportamento: Hábitos noturnos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 6 a 7 meses.

Nº de ovos: 7 a 15.

Peso adulto: 800 a 1200 g

Alimentação na natureza: Carnívoros: roedores, morcegos e aves.

# SUAÇUBOIA



- Serpente noturna de hábito arborícola.
- É agressiva e rápida, apesar de morder apenas quando molestada. Mata suas presas por constrição.
- Apresenta variação ontogenética na cor e nos adultos vários padrões de coloração ao longo de sua distribuição.
- Encontrada na Bacia Amazônica, Equador, Peru, até o sul da Colômbia.
- Tem a cabeça grande e o corpo, fino e longo, que pode ter até 2,30m de comprimento.
- Não é uma espécie venenosa.

# JACARÉ-DE-PAPO-AMARELO



Nome científico: *Caiman latirostris*

Distribuição: Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil.

Habitat: Lagos, rios e regiões pantanosas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 50 a 80 anos.

Incubação: 70 a 90 dias.

Nº de ovos: 25.

Peso Adulto: 90kg

Alimentação na Natureza: Carnívoros: peixes, anfíbios, pequenos reptéis e mamíferos.

Ameaçado  
de Extinção

# JACARÉ-DE-PAPO-AMARELO



- Animais exotérmicos, ou seja, dependem do sol para que seu sangue circule pelo corpo.
- São agressivos quando ameaçados, se não incomodados, são passíveis.
- Possuem uma das mordidas mais fortes do reino animal com mais ou menos 80 dentes na boca.
- Se alimentam de peixes, patos, serpentes, alguns anfíbios e filhotes de jacarés.
- Chegam a medir de 3.5m a 4.5m pesando 100kg.

Ameaçado  
de Extinção

# JACARÉ DO PANTANAL



Nome científico: *Caiman crocodylus yacare*

Distribuição: Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil.

Habitat: Lagos, rios e regiões pantanosas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 50 a 80 anos.

Incubação: 70 a 80 dias.

Nº de ovos: 30 a 50.

Peso Adulto: 70kg

Alimentação na Natureza: Carnívoros: peixes, anfíbios, pequenos reptéis e mamíferos.

# JACARÉ DO PANTANAL



- Se alimentam de peixes, patos, serpentes, alguns anfíbios e filhotes de jacarés.
- Chegam a medir de 3m a 3.5m pesando 75kg.
- É um crocodiliano de pequeno-médio porte e, devido ao seu tamanho, se torna presa favorita da onça-pintada e da suçuri.
- Os jacarés são ecologicamente importantes porque fazem o controle biológico de outras espécies animais.
- Seu padrão de coloração é bastante variado, sendo o dorso particularmente escuro, com faixas transversais amarelas, principalmente na região da cauda.

# CARTILHA ZOOOLÓGICO



# LEBRE



Nome científico: *Lepus sp*

Distribuição: Originalmente da Europa.

Habitat: Campos abertos e pastagens delimitadas por cercas vivas.

Comportamento: Vivem em grupos.

Longevidade: 20 anos.

Gestação: 45 a 53 dias.

Nº de Filhotes: 2 a 8.

Peso Adulto: 3 a 5 kg

Alimentação na Natureza: Herbívoros: folhas e frutos.

# LEBRE



- Tem origem europeia, mas hoje ocupa praticamente o mundo inteiro.
- São animais extremamente rápidos, ágeis e saltam com muita precisão.
- São herbívoros e se reproduzem com muita facilidade.
- O que diferencia a lebre do coelho são as orelhas menores e a sua velocidade.
- São bastante utilizadas como animais de estimação e podem viver até 20 anos.
- A lebre geralmente é um animal muito tímido, podendo viver em pares ou solitariamente.

# PATO



Nome científico: *Cainara moschata*

Distribuição: América do Sul.

Habitat: Zonas úmidas (rios, lagos e pântanos).

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 15 anos.

Incubação: 5 semanas.

Nº de ovos: 5 a 10.

Peso Adulto: 200 a 400 g

Alimentação na Natureza: Onívoro: Vegetação aquática, moluscos e pequenos invertebrados.

# PATO



- Vivem em bandos e são muito ariscos.
- Quando dois patos entram em luta eles se atacam a bicadas e unhadas, onde o mais fraco foge e o vencedor toma seu lugar junto da fêmea que o espera, afastando qualquer rival que ouse aproximar-se.
- É de fácil reprodução, e o que os distingue dos marrecos é uma camada de carne e pele sobre o seu bico, denominada carúncula.
- Seu bico é longo, achatado e serrilhado, e seus dedos curtos com membranas interdigitais.
- O pato é um dos poucos animais da natureza que anda, nada e voa com razoável competência.

# MARRECO



Nome científico: *Anas boschas*

Distribuição: Originário da América do Norte.

Habitat: Zonas úmidas (rios, lagos e pântanos).

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 15 anos.


Incubação: 4 semanas.

Nº de ovos: 5 a 10.

Peso Adulto: 200 a 400 g

Alimentação na Natureza: Onívoro: Vegetação aquática, moluscos e pequenos invertebrados.

# MARRECO



- São aves migratórias e são orientadas pelo campo magnético da Terra, pela posição do Sol e das estrelas.
- Seus ouvidos possuem canais sensíveis ao campo magnético que funcionam como uma bússola.
- Após a estação de acasalamento, os filhotes aprendem a nadar, voar e pescar com a cabeça mergulhada.
- Este pato migrador nidifica um pouco por toda a Europa e África.
- O macho caracteriza-se pela cabeça cor de chocolate com uma lista supraciliar branca bem marcada, a fêmea é mais acastanhada.

# GANSO



Nome científico: *Anser anser*

Distribuição: Europa

Habitat: Zonas úmidas e pantanosas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 15 anos.

Incubação: 28 a 30 dias.

Nº de ovos: 4 a 6.

Peso Adulto: 5 a 7 kg

Alimentação na Natureza: Vegetação aquática.

# GANSO



- Ave aquática de médio porte com comportamento agressivo, e se ameaçado pode atacar humanos.
- Possuem um bico pouco curto, arredondado, forte e serrilhado e seus dedos são curtos com membranas interdigitais.
- Formam laços afetivos com sua família para a vida toda.
- Andam em bandos para proteger a família.
- Voam em V, o que faz que consigam voar 70% mais longe pelo vácuo.
- Os gansos habitam regiões de clima temperado, migrando para locais mais quentes durante o inverno.

# CISNE-NEGRO



Nome científico: *Cygnus atratus*

Distribuição: Austrália Ocidental.

Habitat: Lagos pouco profundos.

Comportamento: Não tem hábito migratório.

Longevidade: 15 anos.

Incubação: 35 dias.

Nº de ovos: 3 a 8.

Peso Adulto: Até 9 kg

Alimentação na Natureza: Vegetação aquática.

# CISNE-NEGRO



- Não é uma ave migratória, mas percorre grandes distâncias a procura de alimento.
- Uma vez acasalados, permanecem por toda a vida junto.
- Com seu grande pescoço conseguem pegar a vegetação aquática nos lagos poucos profundos.
- Os filhotes nascem brancos, passeiam nas costas dos pais quando pequenos e começam a voar aos 6 meses de idade.
- Quando as crias já estão aptas para nadar, com a sua plumagem definitiva, é comum ver famílias inteiras em busca de alimento nos lagos.
- São animais endêmicos da Austrália.

# PAVÃO BRANCO



Nome científico: *Pavo cristatus alba*

Distribuição: Índia.

Habitat: Florestas e campos.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 27 a 28 dias.

Nº de ovos: 8 a 10.

Peso adulto: 3 a 4 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: sementes, grãos, insetos e cocos.

# PAVÃO BRANCO



- Os Pavões tem uma característica bem distinta das outras aves.
- Os machos se diferenciam das fêmeas por possuírem longas penas em sua cauda, sendo um atrativo na conquista da fêmea e na proteção da sua prole, já que o macho chamará atenção do predador enquanto a fêmea foge com os filhotes.
- O Pavão Branco tem a coloração branca pela ausência de melanina.
- Só consegue voar depois de correr uma determinada distância.

# PAVÃO VERDE



Nome científico: *Pavo mulicus*

Distribuição: Índia, Indochina, Java e Sumatra.

Habitat: Florestas e campos.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 26 a 28 dias.

Nº de ovos: 8 a 10.

Peso adulto: 3 a 4 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: sementes, grãos, insetos e cocos.

# PAVÃO VERDE



- A fêmea põe até 10 ovos que são incubados cuidadosamente durante 30 dias.
- Não são animais domesticáveis, pois são muito brigões e não gostam da presença de outros animais.
- O pavão mede até 2,15 m de comprimento, incluindo a cauda.
- O macho gosta de se exhibir enquanto a fêmea protege a família.
- Os pavões passam a noite no topo das árvores, e quando ameaçados, é para as árvores que eles fogem.
- Ao cair da noite costumam gritar, sendo que na época do acasalamento seus gritos se tornam frequentes.

# PAVÃO AZUL



Nome científico: *Pavo cristatus*

Distribuição: Himalaia, Ceilão e Índia.

Habitat: Florestas.

Comportamento: Vivem em bandos.

Longevidade: 20 anos.

Incubação: 26 a 28 dias.

Nº de ovos: 8 a 10.

Peso adulto: 3 a 4 kg

Alimentação na natureza: Onívoro: sementes, grãos, insetos e cocos.

# PAVÃO AZUL



- O que difere dos outros pavões é a coloração azul do peito.
- São aves territorialistas, ou seja, não aceitam a presença de outros animais, sobretudo se forem machos da mesma espécie.
- Cada macho acasala com várias fêmeas. O ritual do acasalamento é marcado principalmente pela forma como o macho corteja a fêmea.
- A beleza das penas e a exuberância das cores na cauda do pavão fazem com que essa ave seja considerada uma ave ornamental.